



**DANIELE EBERLE**

CONSULENTE GESTIONE VIGNETI • SVILUPPO PROGETTI DI FILIERA

## Gestione del Mal dell'Esca in vigneto

**Protocollo di gestione preventiva del Mal dell'esca a partire da impianti giovani e per impianti adulti, continua negli anni.**

Porre attenzione riguardo alle seguenti operazioni:

- 1) **Potatura:** dimensione e posizione dei tagli di potatura;
  - 2) **Trattamento dei tagli di potatura;** tempismo
  - 3) **Gestione delle piante morte:** asportazione tempestiva piante morte, e parti di piante morte, e allontanamento dal vigneto
- 

### 1) POTATURA

- Le ferite di potatura rappresentano la via principale di penetrazione del complesso dell'esca;
- Evitare tagli di potatura grossi;
- Non operare con tagli rasi, ma lasciare sempre un legno di rispetto pari al diametro del legno da eliminare.
- Potature subito dopo la caduta delle foglie, o peggio dopo la vendemmia, aumento il rischio di infezione.

### 2) TRATTAMENTO DEI TAGLI DI POTATURA

- Le condizioni ottimali per l'avvio dell'infezione sono temperatura minima di 10 °C e pioggia.
- la fase fenologica più a rischio infettivo è il pianto della vite;
- La ferita di potatura rimane aperta per diversi mesi fino a maggio;
- Il trattamento dei tagli di potatura aiuta a posticipare e rallentare la comparsa di mal dell'esca;
- Il trattamento del taglio di potatura deve essere fatto prima che si verifichino le condizioni di infezione;
- Nel caso di tagli di ritorno (tagli grossi) intervenire tempestivamente sulla zona di taglio con un pennello applicando del mastice, badando a non lasciare zone non coperte e coprendo anche le crepe;
- Non sono efficienti nella trasmissione della infezione le forbici di potatura, la prepotatrice, la spollonatrice, la cimatrice. Non serve disinfettare le forbici di potatura.



Formulati per la protezione dei tagli di potatura e delle ferite	
INTEGRATO	BIOLOGICO
Tessior (pyraclostrobin – boscalid) (BASF)	Formulati a base di Trichoderma come Remedier (Gowan), Esquiwe WP (Sumitomo), Tellus WP (Syngenta), Vintec (Belchim)

### 3) GESTIONE DELLE PIANTE MORTE

- Monitoraggio della comparsa dei sintomi durante la stagione vegetativa;
- Contrassegnare le piante infette;
- È fondamentale asportare dal vigneto i ceppi morti e le parti di tronco incastrate nei fili, rimuoverli dalla fila e allontanarli dal vigneto prima dell'evento infettivo, indicativamente prima del pianto (aprile);
- È importante trinciare i sarmenti prima che si verifichino le condizioni di infezione;
- In alternativa alla trinciatura, è possibile asportare i sarmenti e compostarli all'esterno del vigneto.

Redatto 2024



[www.eberle-vine.it](http://www.eberle-vine.it)