



# DANIELE EBERLE

CONSULENTE GESTIONE VIGNETI • SVILUPPO PROGETTI DI FILIERA

## GESTIONE FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2024

- 1) **Materiale vegetale:** sano e da filiera vivaistica controllata;
  - 2) **Gestione del vigneto:** monitoraggio dell'insetto vettore, trattamenti insetticidi, taglio delle piante e/o delle parti vegetali sintomatiche, gestione dei polloni;
  - 3) **Gestione incolti limitrofi:** controllo degli adulti e delle piante ospite.
- 

### 1) Materiale vegetale: sano e da filiera vivaistica controllata

Rivolgersi a vivaisti di fiducia che producono materiale certificato e termo-trattato sottoposto a controllo di filiera, vigneto piante madri marze, vigneto piante madri portinnesto, barbatellaio lontano da zone vitate.

### 2) Gestione del vigneto:

#### a. Monitoraggio dell'insetto vettore

- i. Monitoraggio giovani da metà maggio a fine giugno con rilievo in campo settimanale;
- ii. Monitoraggio adulti con trappole cromotattiche a cadenza quindicinale da fine giugno a ottobre.

Fare attenzione nella scelta delle trappole cromotattiche all'adesività della colla

#### b. Trattamenti insetticidi

- i. Effettuare i trattamenti ricordandosi l'obbligatorietà di lotta contro l'insetto vettore (*Scaphoideus titanus*) come indicato dai bollettini fitosanitari emanati dal Settore Fitosanitario delle Regione Piemonte;
- ii. Eseguire i trattamenti facendo particolare attenzione alla modalità con cui essi vengono effettuati, nello specifico:
  - Trattare tutti i filari;
  - Utilizzare elevati volumi di acqua (400-500 L/ha);
  - Acidificare l'acqua;
  - Garantire una omogenea distribuzione dell'insetticida della parete vegetale ma anche del ceppo;
  - Trattare prima i lati esterni del vigneto e successivamente quelli interni.

dott. agr. Daniele Eberle  
Via XX Settembre 81  
14048 Montegrosso d'Asti (AT) - Italy  
PIVA: 02856430042  
SDI: SUBM70N  
pec: d.eberle@pec.libero.it



+39 335 1446923  
daniele@eberle-vine.it  
www.eberle-vine.it  
Skype: d.eberle\_4

STRATEGIA DI INTERVENTO	
BIOLOGICA	INTEGRATA
1° TRATTAMENTO: II età - Piretro naturale	1° TRATTAMENTO: III età – Sistemico (Flupyradifurone - Acetamiprid)
2° TRATTAMENTO: III età – Piretro naturale	2° TRATTAMENTO: V età – Contatto (Piretroidi)

**c. Taglio delle piante e/o delle parti vegetali sintomatiche**

- i. Taglio dei germogli sintomatici a mano a mano che si manifestano nel corso della stagione, da luglio in poi;
- ii. Capitozzatura delle piante completamente sintomatiche a mano a mano che si manifestano, da luglio in poi, dopo il trattamento insetticida (per evitare che gli insetti si spostino da piante infette a piante sane). Lasciare la vegetazione sulla parete a seccare. Asportare le piante morte durante l'inverno e rimuoverle dal vigneto (contengono le uova dello scafoideo) prima di aprile.

**d. Gestione dei polloni**

- i. I polloni vanno rimossi prima che lignifichino alla base, indicativamente entro i primi 20 cm di lunghezza (maggio).  
Nel caso in cui siano presenti i polloni al momento del trattamento insetticida effettuare una loro omogenea bagnatura.

**3) Gestione incolti limitrofi: controllo degli adulti e delle piante ospite**

- a. Verificare la presenza degli adulti negli incolti limitrofi posando le trappole cromotattiche in prossimità delle piante di vite spontanea nell'incolto.
- b. Durante l'inverno procedere con la pulizia dell'incolto con il taglio della vite spontanea alla base del ceppo.

Redatto 2024

